# Akut Lenfoblastik Lösemi

Prof. Dr. Fevzi ALTUNTAŞ

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi

İç Hastalıkları Anabilim Dalı

Hematoloji Bilimdalı Öğretim Üyesi

Dönem-IV, 2020, Ankara

# AKUT LÖSEMİ


# Akut Lösemi

- Tanım :
  - Kemik iliği ve vücut dokularında kontrolsüz biriken klonal blast hücreleri ile karakterize malign hastalıklardan biridir.
- Ani başlangıçlı
- Eğer tedavi edilmezse birkaç hafta veya ay içinde ölümcüldür.
- İnsidans: 2-3 / 100,000

Prof. Dr. FEVZİ ALTUNTAŞ
www.drfevzialtuntas.com

# Sınıflandırma


- Akut lösemi:
  - Akut myeloid lösemi (AML)
    - İleri yaşta sık
  - Akut lenfoblastik lösemi (ALL)
    - Çocuklarda sık




Prof. Dr. FEVZİ ALTUNTAŞ
www.drfevzialtuntas.com

# *Sınıflandırma*


## Akut lenfoblastik lösemi (ALL)




Prof. Dr. FEVZİ ALTUNTAŞ
www.drfevzialtuntas.com

# Akut Lenfoblastik Lösemi (ALL)

- Lenfositleri etkileyen kan kanseri
- Yaş, 2-10 yaşlarda yaygın
- 3-4. yılda pik.
- İnsidans yaşla birlikte azalır ve 40 yaşından sonra ikincil bir artış.
- **Çocuklarda - en sık görülen lösemi**
  - Çocukluk lösemi %85





Prof. Dr.
FEVZİ ALTUNTAŞ
www.drfevzialtuntas.com

# Akut Lenfoblastik Lösemi (ALL)


Spesifik bulgusu yok

- Kemik ağrısı
- Artrit
- Lenfadenopati
- Hepatosplenomegali
- **Mediastinal kitle**
- **Testis şişmesi**
- **Meningeal sendromu**






# Akut Lenfoblastik Lösemi (ALL)




Prof. Dr. FEVZİ ALTUNTAŞ
www.drfevzialtuntas.com

# Akut Lenfoblastik Lösemi (ALL)



| | Çocuklarda | Erişkinlerde |
|---|---|---|
| **Fizik Muayene** | | |
| Ateş | 50-60 | 35-55 |
| Kanama | 40-50 | 30-35 |
| Kemik ağrısı | 20-30 | 20-30 |
| LAP | 15-20 | 10-15 |
| Hepatomegali | 50-60 | 30-35 |
| Splenomegali | 50-60 | 50-60 |
| Testis büyümesi | 1 | <1 |
| **Laboratuvar Bulguları** | | |
| Lökosit sayısı(*109/L) | | |
| <10 | 50 | 40 |
| >100 | 10 | 15 |
| Hb düzeyi (g/dL) | | |
| <8 | 50 | 30 |
| >10 | 20 | 50 |
| Platelet sayısı (*109/L) | | |
| <50 | 50 | 50 |
| >100 | 30 | 25 |

Prof. Dr. FEVZİ ALTUNTAŞ
www.drfevzialtuntas.com

# İncelemeler


## 1. *Tam kan sayımı*

- **Anemi**
  - **normokromik, normositik**
- **WBC <1.0x10$^9$/l to >200x10$^9$/L,**
  - **Nötropeni ve**
  - **Blastik hücre**
- **Trombositopeni (<10x10$^9$/L)**


| | Çocuklarda | Erişkinlerde |
|---|---|---|
| **Fizik Muayene** | | |
| Ateş | 50-60 | 35-55 |
| Kanama | 40-50 | 30-35 |
| Kemik ağrısı | 20-30 | 20-30 |
| LAP | 15-20 | 10-15 |
| Hepatomegali | 50-60 | 30-35 |
| Splenomegali | 50-60 | 50-60 |
| Testis büyümesi | 1 | <1 |
| **Laboratuvar Bulguları** | | |
| Lökosit sayısı(*109/L) | | |
| <10 | 50 | 40 |
| >100 | 10 | 15 |
| Hb düzeyi (g/dL) | | |
| <8 | 50 | 30 |
| >10 | 20 | 50 |
| Platelet sayısı (*109/L) | | |
| <50 | 50 | 50 |
| >100 | 30 | 25 |

Prof. Dr. FEVZİ ALTUNTAŞ
www.drfevzialtuntas.com

# İncelemeler



Akut lenfoblastik lösemi





Akut myeloid lösemi

Prof. Dr.
FEVZİ ALTUNTAŞ
www.drfevzialtuntas.com

# İncelemeler

- **ALL (Lenfoblast)**
  - **Blast boyutları** :küçük
  - **Sitoplazma**: dar
  - **Kromatin**: yoğun
  - **Nükleolus** :belirsiz
  - **Auer-rod**: yok
- **AML (Myeloblast)**
  - büyük
  - orta
  - ince/dantelli
  - tanınmış
  - % 50 mevcut






# İncelemeler

*2. Kemik iliği aspirasyonu* ve biyopsisi

- Akut lösemiyi doğrular.
- **Blast>% 25** (WHO)
- Genellikle hiperselüler.




Prof. Dr. FEVZİ ALTUNTAŞ
www.drfevzialtuntas.com

# İncelemeler

## *3.* Sitokimyasal boyama

a) **Peroksidaz (MPO):**
   a) **Negatif ALL**
   b) **Pozitif AML**




MPO pozitif myeloblast

Prof. Dr. FEVZİ ALTUNTAŞ
www.drfevzialtuntas.com

# İncelemeler

b) Periodic acid schiff (PAS)
   - Pozitif= ALL
   - Negatif = AML




PAS pozitif lenfoblast

Prof. Dr. FEVZİ ALTUNTAŞ
www.drfevzialtuntas.com

# İncelemeler

## c) Asit Fosfataz:

- **Fokal pozitif= T-ALL**



Prof. Dr.
FEVZİ ALTUNTAŞ
www.drfevzialtuntas.com

# İncelemeler

## *4.Immunofenotip*

- Blast hücreleri üzerinde mevcut olan antijenler tanımlar.
- Löseminin; lenfoid veya miyeloid olup olmadığını belirler (özellikle : sitokimyasal belirteçleri negatif ya da şüpheli olduğunda önemlidir. Örn: AML-MO).
- **T-ALL ve B-ALL ayırımını sağlar.**

Prof. Dr. FEVZİ ALTUNTAŞ
www.drfevzialtuntas.com


# İncelemeler

## *4.Immünofenotip*

- Bazı antijenler prognostik öneme sahip
- Miyeloid ve lenfoid antijen her ikisi de aynı blast hücrelerisinde ise: bifenotipik tip, nadir.
- Lösemi alt tipi tanımlamak mümkün. Örnek: AML M7 ; CD 61 gibi belirli bir yüzey işaretleyici vardır
- Monoklonal antikorlar (MoAb) lökositler üzerinde antijene dayalı grup ve farklılaşma (CD) ile kaydedilmektedir.

Prof. Dr. FEVZİ ALTUNTAŞ
www.drfevzialtuntas.com

# İncelemeler




Prof. Dr. FEVZİ ALTUNTAŞ
www.drfevzialtuntas.com

# İncelemeler

- Monoklonal antikorlar (McAb) farklılaşmış kümeler olarak kaydedilir (CD).
- **ALL ve AML KARAKTERIZASYONU İÇİN kullanılan monoklonal antikorlar.**

**ALL :** **B-ALL** **CD10, CD 19, CD22**

**T-ALL** **CD3, CD7**

Prof. Dr. FEVZİ ALTUNTAŞ
www.drfevzialtuntas.com

# İncelemeler

## B- ALL

| | TdT | CD19 | CD79 | CyCD22 | CD10 | CylgM | sIg | Sk/l |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pro-B | + | + | + | + | - | - | - | - |
| Common | + | + | + | + | + | - | - | - |
| Pre-B | + | + | + | + | + | +/- | - | - |
| B-Mature | - | + | + | + | - | - | + | + |

Ig gene rearrangement

## T- ALL

| | TdT | CyCD3 | CD7 | CD2 | CD5 | CD1a | sCD3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pro-T | + | + | + | - | - | - | - |
| Pre-T | + | +/- | + | + | + | - | - |
| T-Cortical | + | - | + | + | + | + | +/- |
| T-Mature | +/- | - | + | + | + | - | + |

TCR gene rearrangement

Prof. Dr. FEVZİ ALTUNTAŞ
www.drfevzialtuntas.com

# İncelemeler

## EGIL (Avrupa Lösemi İmmulojik Sınıflama Grubu) Skorlama Sistemi

| Points | Myeloid | B-lineage | T-lineage |
|---|---|---|---|
| 2 | MPO | CD79a<br>Cyt IgM<br>Cyt CD22 | CD3, cyt and surface<br>TCR αβ<br>TCR γδ |
| 1 | CD13<br>CD33<br>CD65 | CD19<br>CD10<br>CD20 | CD2<br>CD5<br>CD8<br>CD10 |
| 0.5 | CD14<br>CD15<br>CD64<br>CD117 | TdT<br>CD24 | TdT<br>CD7<br>CD1a |

*Abbreviations:* MPO, myeloperoxidase; TdT, terminal deoxynucleotidyl transferase; cyt, cytoplasmic; TCR, T-cell receptor.
≥ 2 points are required to assign a lineage.

Prof. Dr. FEVZİ ALTUNTAŞ
www.drfevzialtuntas.com

# İncelemeler

## *5. Sitogenetik ve moleküler çalışmalar*

- **lösemik klondaki anormallikleri tespit eder**
- **teşhis veya prognostik değeri vardır**
  - **Örn: Philadelphia kromozomu: kromozomlar 9 ve 22 arasındaki translokasyon ürünüdür**
    - **Çok kötü prognoz ilişkili**

Prof. Dr. FEVZİ ALTUNTAŞ
www.drfevzialtuntas.com


# İncelemeler

## AKUT LÖSEMİ İLE İLİŞKİLİ YAYGIN KROMOZOM ANORMALLİKLERİ

- t(9;22) = B-ALL
- t(8;14) = B-ALL

Prof. Dr. FEVZİ ALTUNTAŞ
www.drfevzialtuntas.com

# Philadelphia kromozomu




Mosby items and derived items © 2006 by Mosby, Inc.

Prof. Dr. FEVZİ ALTUNTAŞ
www.drfevzialtuntas.com

Table 2. Main genetic abnormalities in ALL

| Disease | Abnormality | Genes involved | Incidence | Molecular detection |
|---|---|---|---|---|
| B-ALL | t(9;22)(q34;q11) | BCR ABL | Adults: 30%<br>Children: 3% | RT-PCR |
| | t(12;21)(p13;q22) | TEL AML1 | Adults: <1%<br>Children: 20% | RT-PCR |
| | t(4;11)(q21;q23) | MLL AF4 | Adults: 5%<br>Infants: 60% | RT-PCR |
| | t(1;19)(q23;p13) | E2A PBX1 | 5% | RT-PCR |
| | t(8;14)(q24;q32) | c-MYC IgH | 1% | FISH |
| | t(17;19)(q22;p13) | E2A HLF | <1% | RT-PCR |
| | t(11;19)(q23;p13) | MLL ENL<br>JAK1/2/3 mutations | <1%<br>10% | RT-PCR<br>Sequencing |
| T-ALL | t(10;14)(q24;q11)<br>t(7;10)(q34;q24 | HOX11 TCR $\alpha/\delta$<br>HOX11 TCR $\beta$ | Adults: 31%<br>Children: 7% | RT-PCR |
| | t(5;14)(q35;q32) | HOX11L2<br>TCR $\beta$ | Adults: 13%<br>Children: 20% | RT-PCR, FISH |
| | t(1;14)(p32;q11) | TAL1 TCR $\alpha/\delta$ | 1-3% | RT-PCR |
| | Normal 1p32 | SIL TAL1 | 9-30% | RT-PCR |
| | inv(7)(p15q34), t(7;7) | HOXA genes TCR $\beta$ | 5% | FISH, RT-PCR |
| | t(10;11)(p13;q14-21) | CALM AF10 | 10% | FISH |
| | t(9;9)(q34;q34) | NUP214 ABL1 | 6% | FISH |
| | t(9;14)(q34;q34) | EML1 ABL1 | <1% | FISH |
| | NOTCH1 mutations | NOTCH1 | 50% | Sequencing |
| | JAK1 mutations | JAK1 | 18% | Sequencing |

Prof. Dr. FEVZİ ALTUNTAŞ
www.drfevzialtuntas.com


# Diğer

6. *Biyokimyasal tarama*
   - Lökosit sayısı çok yüksek - böbrek yetmezliği ve hiperürisemi
7. *Akciğer grafisi*
   - Mediastinal kitle T-ALL hastalarında % 70
8. *Lomber ponksiyon*
   - İlk evreleme, beyin omurilik sıvısında lösemi hücrelerini saptamak için yapılır, SSS tutulumu gösterir.
   - Akut lenfoblastik lösemide yapılır.

Prof. Dr. FEVZİ ALTUNTAŞ
www.drfevzialtuntas.com

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ 2010

ALL




Prof. Dr. FEVZİ ALTUNTAŞ
www.drfevzialtuntas.com

# ALL FAB morfolojik sınıflaması

| | | |
|---|---|---|
| L1 | Küçük, uniform, çekirdek düzenli, dar stoplazmalı, stoplazma granülsüz, nukleolus yok | % 31 |
| L2 | Daha Büyük, üniform değil, çekirdek düzensiz, nükleolus belirgin, daha geniş stoplazma | %60 |
| L3 | Büyük, uniform, bazofilik vakuolli sitoplazma, çekirdek düzenli, nükleolus var | %9 |


* L1 en iyi prognoza sahip olan tipdir, çocuklarda en sık görülen tipdir.
* L2 erişkinlerde en sık görülen tipdir.
* L3 en nadir ve en kötü prognoza sahip tipdir.


Prof. Dr. FEVZİ ALTUNTAŞ
www.drfevzialtuntas.com


# FAB Akut Lenfoblastik Lösemi

Akut lenfoblastik lösemi(ALL)*

- L-1 %85 (Ç) - %31 (E)
- L-2 %14 (Ç) - 60% (E)
- L-3 (Burkitt) %1 (Ç) - %9 (E)







Prof. Dr. FEVZİ ALTUNTAŞ
www.drfevzialtuntas.com

# ALL- 2016 WHO Sınıflaması

## Lenfoblastik Lösemi Sınıflaması

**B-lenfoblastik lösemi**

- B-lenfoblastik lösemi, NOS
- Tekrarlayan genetik anormalliklerin eşlik ettiği B-lenfoblastik lösemi
- t(9;22)(q34.1;q11.2); BCR-ABL1'in eşlik ettiği B-lenfoblastik lösemi
- t(v;11q23.3);KMT2A yeniden düzenlenmesinin eşlik ettiği B-lenfoblastik lösemi
- t(12;21)(p13.2;q22.1); ETV6-RUNX1'in eşlik ettiği B-lenfoblastik lösemi
- Hiperdiploidinin eşlik ettiği B-lenfoblastik lösemi
- Hipodiploidinin eşlik ettiği B-lenfoblastik lösemi
- t(5;14)(q31.1;q32.3) IL3-IGH 'in eşlik ettiği B-lenfoblastik lösemi
- t(1;19)(q23;p13.3); TCF3-PBX1'in eşlik ettiği B-lenfoblastik lösemi
- Provizyonel Antite: BCR-ABL1 benzeri B-lenfoblastik lösemi
- Provizyonel Antite: iAMP21'in eşlik ettiği B-lenfoblastik lösemi

**T- lenfoblastik lösemi**

- Provizyonel Antite: Erken T hücre prekursor lenfoblastik lösemi
- Provizyonel Antite: Doğal Öldürücü (NK) hücre lenfoblastik lösemi

Prof. Dr. FEVZİ ALTUNTAŞ
www.drfevzialtuntas.com

# ALL İMMÜNOLOJİK SINIFLAMASI

## B-ALL

•**CD 19, 79a ve 22'den en az ikisi (+)**. Çoğu vaka TdT+ ve HLA-DR+'dir

- **Pro-B ALL (B-I):** Yukarıdakiler dışında ekspresyon yok (% 11)
- **Common ALL (B-II):** **CD 10 +** (% 51)
- **Pre-B ALL (B-III):** CD 10 +/- ; stoplazmik Ig M + (% 10)
- **Matür B ALL (B-IV):** CD 10 +/- ; yüzey IgM+ ya da yüzey ya da stoplazmik hafif zincir (kappa ya da lambda) pozitif (% 4)

*Burkitt ALL (matür B ALL) aşağıdaki gibi tanımlanır:*

*1) L3 morfolojisi, veya*

*2) **karakteristik sitogenetik translokasyonların [t(8;14)(q24;q32)/ t(2;8)(p12;q24)/ t(8;22)(q24;q11)]** ya da sitogenetik verisi olmayan vakalarda moleküler analizde **c-myc yenidiziliminin varlığı**; ve*

*3) **> % 20 sIg pozitifliği** ya da CD19 veya CD20 ile birlikte klonal κ/λ hafif zincir ekspresyonu (J Clin Oncol 1999;17:2461).*

*Bu 3 kriterden yalnızca birisinin varlığı da Burkitt ALL için yeterli kabul edilebilir*

## T-ALL

stoplazmik ya da yüzey CD 3 +'dir. Ek pozitiflikler aşağıdaki alt grupların tanınmasına olanak sağlar:

- Pre-T ALL (T-I): Stoplazmik CD 3 + ; CD 7 + (% 7)
- T-ALL (T-II, III, IV): CD 7 + ; CD 2 + ; ve/veya CD 5 + ve/veya CD 8 + ; CD 1a +/- (% 17)

Prof. Dr. FEVZİ ALTUNTAŞ
www.drfevzialtuntas.com

# ALL: Sınıflama

| Immunologic subtype | % of cases | FAB subtype | Cytogenetic abnormalites |
|---|---|---|---|
| Pre B ALL | 75 | L1,L2 | t(9;22),t(4;11) t(1;19) |
| Tcell ALL | 20 | L1,L2 | 14q11 or 7q34 |
| Mature Bcell ALL(burkitt leukemia) | 5 | L3 | t(8;14) |

Prof. Dr. FEVZİ ALTUNTAŞ
www.drfevzialtuntas.com

# Akut lösemi sınıflama-WHO

1. Lenfoid lösemiler
    1. **Prekürsör B** Lenfoblastik Lösemi/Lenfoma (ALL/LBL):
        1. ALL: çocuklarda sık (çocukluk çağı ALL %80-85);
        2. LBL: Genç erişkinlerde ve nadir;
        3. FAB L1 veya L2 blast morfoloji
    2. **Prekürsör T ALL/LBL:**
        1. Çocukluk çağı ALL %15
        2. Erişkin ALL %25
    3. **Burkit Lösemi/Lenfoma**
        1. FAB- L3

Prof. Dr. FEVZİ ALTUNTAŞ
www.drfevzialtuntas.com

# Akut Lenfoblastik Lösemi / Lenfoma (WHO)

1. *Prekürsör B Lenfoblastik Lösemi/Lenfoma*
   - t (9;22) (q34;q11)
   - t (v;11) (v;q23)
   - t (12;21) (p12;q22)
   - Hipodiploidi
   - Hiperdiploidi (> 50)

2. *Prekürsör T Lenfoblastik Lösemi/Lenfoma*

3. *Burkitt Lenfoma/Lösemi*

Kİ' nde ≤ % 25 Blast ise Lenfoma
> % 25 Blast ise Lösemi

Prof. Dr. FEVZİ ALTUNTAŞ
www.drfevzialtuntas.com

# Prekürsör B lenfoblastik lösemi/lenfoma

- L1, L2 veya karışık blastik hücre morfolojisi gösterir
- B hücre yüzey antijenlerinin pozitifliği ile karakterizedir
  - **CD19, CD20, CD22, CD79 (+)**
- Keza CD10, HLA-DR, TdT ve nadiren CD34 (+) de olabilir
- Genetik olarak;
  - İyi
  - Orta
  - Kötü olarak 3 gruba ayrılır

Prof. Dr. FEVZİ ALTUNTAŞ
www.drfevzialtuntas.com

# Prekürsör B lenfoblastik lösemi/lenfoma

- Sitogenetik alt gruplar;
  - **t(9;22) (BCR/ABL)**
  - t(v;11q23) (MLL=Myeloid lenfoid lösemi geni)
  - t(1;19) (E2A/PBX1)
  - t(12;21) (TEL/AML1)

Prof. Dr. FEVZİ ALTUNTAŞ
www.drfevzialtuntas.com

# Prekürsör T lenfoblastik lösemi/lenfoma

- L1, L2 veya karışık blastik hücre morfolojisinde olabilir.
- T hücre yüzey antijenlerinin pozitifliği ile karakterizedir.
  - **CD2, sCD3, CD5, CD7 ve cCD3**
- Genellikle TdT (+) ve HLA-DR (-) saptanır.
- Çeşitli kromozomal bozukluklar tarif edilmiştir.

Prof. Dr. FEVZİ ALTUNTAŞ
www.drfevzialtuntas.com

# Burkitt lösemi/lenfoma

- Prekürsör lenfoid neoplazm grubundan değildir.
- Lenfoma WHO sınıflamasında matür B hücreli neoplazm olarak ele alınmıştır.
- FAB sınıflamasına göre L3 morfoloji gösterir.
- İmmünolojik olarak;
  - sIg, CD19, CD20, CD22, HLA-DR (+)
  - TdT (-)
  - CD10 (+) olabilir.

Prof. Dr. FEVZİ ALTUNTAŞ
www.drfevzialtuntas.com

# ALL - Kötü Prognostik Faktörler

| | Standart | Kötü |
|---|---|---|
| Yaş | Genç (<35) | İleri yaş (>35) |
| Sitogenetik | Hiperdiploidi | Ph+, t(4;11) |
| Lökosit sayısı | <30.000/µL | >30.000 /µL (B-ALL)<br>>100.000 /µL µ(T-ALL) |
| İmmünofenotip | Timik-ALL | Pro-B-ALL<br>Erken T-ALL<br>Matür T-ALL |
| Tam yanıta (TR) kadar geçen süre | <2-4 hafta | >2-4 hafta |
| Minimal kalıntı hastalık (MRH) | Negatif | Pozitif |

Prof. Dr. FEVZİ ALTUNTAŞ
www.drfevzialtuntas.com

# TEDAVİ

SSS PROFİLAKSİSİ

**İNDÜKSİYON**

Vinkristin
Steroid
Antrasiklin
Siklofosfamid

**KONSOLİDASYON**

**İNTENSİFİKASYON**

Modifiye indüksiyon
Dönüşümlü konsolidasyon
KHN

**İDAME**

Vinkristin
Prednizon
6-MP

**Risk bazlı tedavi**

Prof. Dr. FEVZİ ALTUNTAŞ
www.drfevzialtuntas.com

# **TEDAVİ** - Stratejisi

- **İndüksiyon kemoterapisi**
  - Amaç: Tam yanıt elde etmektir
    - Kemik iliğinde blast sayısı < 5% düşürmek ve Normal periferik kan tablosu
- **SSS proflaksisi - ALL (radyoterapi, mtx, ara-c, dxm)**
  - Amaç: SSS hastalığını önlemek
- **Remisyon sonrası tedavisi**
  - Amaç: Kalıntı hastalığı yok etmek
    - **Intensifikasyon : Kemoterapi (KT)**
    - **Konsolidasyon: Allojeneik KHN/KT**
    - **İdame: KT**

Prof. Dr. FEVZİ ALTUNTAŞ
www.drfevzialtuntas.com

# ALL-Tedavi

| Subtype | Chemotherapy regimen | Imatinib dosing | | | | Results (%) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Induction (mg/d) | Consolidation (mg/d) | Mantenance (mg/d) | No | CR | Relapse | DFS (at y) | Survival (at y) |
| ***Adults*** | | | | | | | | | |
| **Thomas el al** | Hyper-CVAD | C (400) | C (400) | C (400) | 39 | 92 | 14 | 83(3) | 55 (3) |
| **Yanada el al** | JALSG ALL202 | C (600) | A (600) | C (600) | 80 | 96 | 26 | 60 (1)<br>51 (2) | 76 (1)<br>58 (2) |
| **Lee et al** | Modified from Linker | C (600) | C (400) | C (400) | 20 | 95 | 32 | 62 (2) | 59 (2) |
| **Wassmann et al** | GMALL<br>Alternating<br>Concurrent | <br>None<br>None | <br>A (400/600)<br>C (600) | <br>NR<br>NR | <br>47<br>45 | <br>NA<br>NA | <br>NR<br>NR | <br>52 (2)<br>61 (2) | <br>36 (2)<br>43 (2) |
| **de Labarthe el al** | GRAAPH-2003 | None | C (600) | NR | 45 | 96 | 19 | 51 (1.5) | 65 (1.5) |
| **Ottmann et el al** | GMALL<br>Chemotherapy<br>Imatinib | <br>None<br>Only (600) | <br>C (600)<br>C (600) | <br>C (600)<br>C (600) | <br>28<br>27 | <br>96<br>50 | <br>41<br>54 | <br>29 (1.5)<br>57 (1.5) | <br>35 (1.5)<br>41 (1.5) |

*C= concurrent; A= alternating; NR= not reported; NA= not applicable; JALSG = Japan Adult Leukemia Study Group; GMALL= German Multi-Centre Acute Lymphoblastic Leukemia; hyper-CVAD= fractionated cyclophosphamide, vincristine, doxorubicine, dexamethasone; GRAAPH= Group for Research on Adult Acute Lymphoblastic Leukemia; GIMEMA= Gruppo Italiano Malattie Ematologiche dell'Adulto; GRAALL=Group for Research in Adult Acute Lymphoblastic Leukemia; Pred= prednisone*

Prof. Dr. FEVZİ ALTUNTAŞ
www.drfevzialtuntas.com

# ALL-Tedavi






**Table 2** Monoclonal Antibodies for ALL

| Drug | Target | Comment |
|---|---|---|
| Rituximab (Rituxan) | CD20 | Improves overall survival in younger adults with de novo Ph– ALL |
| Ofatumumab (Arzerra) | CD20 | Binding site distinct from that of rituximab, may be beneficial |
| Epratuzumab | CD22 | Studied as part of combination chemotherapy in relapsed pediatric ALL |
| Inotuzumab | CD22 | Antibody-drug conjugate linked to the cytotoxin calicheamicin |
| Blinatumomab | CD19 | Bispecific antibody that engages CD3+ T cells and directs them to CD19+ B cells |
| SAR3419 | CD19 | Antibody-drug conjugate linked to the tubulin toxin maytansine |
| Alemtuzumab (Campath) | CD52 | Limited activity as a single agent in adults with refractory disease |

ALL = acute lymphoblastic leukemia; Ph– = Philadelphia chromosome-

Prof. Dr. FEVZİ ALTUNTAŞ
www.drfevzialtuntas.com

# Erişkin ALL tedavisi




Hematol Oncol Clin North Am 2009;23(5):1011-31

Prof. Dr. FEVZİ ALTUNTAŞ
www.drfevzialtuntas.com

www.drfevzialtuntas.com
faltuntas@hotmail.com

Prof. Dr.
FEVZİ ALTUNTAŞ
www.drfevzialtuntas.com